GALENICA

TRISULFA®

Sulfaméthoxazole + Triméthoprime

Formes et Présentations: - TRISULFA® Fort - Boîtes de 20 comprimés - TRISULFA® Adulte - Boîte de 20 comprimés - TRISULFA® Suspension buvable Pédiatrique - Flacon de 100 ml correspondant à 20 cuilleréesmesure de 5 ml. Composition:

TRISULFA® Fort comprimés	TRISULFA® Adulte comprimés
Sulfaméthoxazole (DCI) ..... 800 mg	Sulfaméthoxazole (DCI)..... 400 mg
Triméthoprime (DCI) ..... 160 mg	Triméthoprime (DCI) ..... 80 mg
Excipient qsp ..... 1 comprimé.	Excipient qsp..... 1 comprimé.

TRISULFA® Suspension buvable pédiatrique	*par c-mesure de 5 ml*
Sulfaméthoxazole (DCI)..... 4,000 g	200 mg
Triméthoprime (DCI) ..... 0,800 g	400 mg
Excipient qsp ..... 100 ml	5 ml

Indications : L'efficacité de l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole sur de nombreux germes procède de son activité antibactérienne et ses caractéristiques pharmacocinétiques: - Les infections urogénitales, en particulier prostatiques. - Les infections ORL : otites - sinusites. - Les infections respiratoires surtout dans le traitement ou la prévention des surinfections compliquant les bronchopneumopathies chroniques.
- Les infections à pneumocystis carnii. - Fièvre typhoïde. - Diarrhée à shigella et Eschérichia coli entérotoxigène. - Choléra. - Contre-indications: - Intolérance à l'un des composants ou aux sulfamides en général. - Déficit en G6PD : risque d'hémolyse. - Prématurés et nouveau-nés en raison de l'immaturité de leurs systèmes enzymatiques. - Grossesse et allaitement.

Précautions d'emploi:

TRISULFA® Fort est déconseillé chez l'enfant de moins de 12 ans. - Un contrôle hématologique périodique est recommandé en cas de: • traitement prolongé ou itératif. • sujets de plus de 65 ans. • sujets carencés en folates. - En cas d'insuffisance rénale ou d'antécédents allergiques, de grossesse, de prise simultanée d'autres médicaments, prévenir le médecin.

Interactions médicamenteuses:

En cas de traitement oral anticoagulant ou anti-diabétique, avertir le médecin qui exercera une surveillance particulière. TRISULFA® est un médicament. Ne pas laisser à la portée des enfants. En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. - Effets indésirables: - Nausées, gastralgies. - Manifestations cutanées et hématologiques : arrêter immédiatement le traitement et prévenir le médecin.

Mode d'emploi et posologie:

- Chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans : - TRISULFA® Adulte: 2 comprimés matin et soir. - TRISULFA®
Fort : 1 comprimé matin et soir. - Cas sévères : 3 comprimés de TRISULFA® Fort par jour. - Chez l'enfant et le nourrisson : Suspension pédiatrique. - De 6 semaines à 5 mois : 1/2 cuillerée-mesure de 5 ml matin et soir.
- De 6 mois à 5 ans (poids corporel < 20 kg) : 1 cuillerée-mesure de 5 ml matin et soir. La posologie pour enfants et nourrissons correspond à-peu-près à une dose quotidienne de 30 mg de sulfaméthoxazole et de 6 mg de triméthoprime par kg de poids corporel. -En cas d'insuffisance rénale, la posologie doit être adaptée en fonction de la clairance de la créatinine. Liste I.